

NCLEX-RN minitest

Vyzkoušejte si sami test zkoušky National Council Licensure Examination (NCLEX-RN)...

1. Která z uvedených strategií bude neúčinnější, když chce sestra při sbírání anamnézy pomoci klientovi získat pocit, že jeho role v péči je opravdu aktivní?

1. Požádá klienta, aby vyplnil dotazník.
2. Poskytne klientovi písemné instrukce.
3. Požádá klienta, aby popsal dosavadní péči o něj, a jaký má na tuto péči názor.
4. Zeptá se klienta, zda má nějaké dotazy.

2. Klient s těžkou depresí říká: „Zastavilo se mi srdce a moje krev se změnila v popel.“ Sestra správně chápe, že tato věta poukazuje na to, že pacient trpí:

1. Halucinacemi.
2. Iluzemi.
3. Bludy.
4. Paranoiou.

3. Dítě se narodí s těmito poškozeními: obličejové vady, malý vzrůst, mentální retardace, poruchy zraku. Který z těchto faktorů matky v průběhu těhotenství pravděpodobně způsobil uvedené abnormality?

1. Užívání alkoholu.
2. Nedostatek vitamínu B6.
3. Nedostatek vitamínu A.
4. Nedostatek kyseliny listové.

4. Klientka, která trpí anginou pectoris, ukazuje sestře nitroglycerin, který nosí v kapse v igelitovém sáčku. Sestra poučí klientku, že nitroglycerin se má uchovávat:


1. V lednici.
2. Na chladném, vlhkém místě.
3. Ve tmavé skleničce, která ochrání lék před světlem.
4. V igelitovém sáčku, aby byl hned po ruce.

5. Multigravida má podstoupit perkutánní odběr pupečnickové krve (PUBS). Sestra klientce vysvětlí, že se výkon používá při vyšetření:

1. Mnohočetného těhotenství (dvojčat).
2. Zralosti plicní tkáně plodu.
3. Rh nemoci.
4. Hladiny alfa-fetoproteinu.

6. Která z následujících potíží je vedlejším účinkem vankomycinu a měla by se okamžitě hlásit lékaři?

1. Vertigo.
2. Tinitus.
3. Tuhnutí svalů.
4. Ataxie.



Správná odpověď s překladem z časopisu Sestra č. 4/06 se skrývala pod číslem 3. Pacient má srdeční selhání a bere diuretika. Které z uvedených výsledků jsou pro sestru nejlepším znamením toho, že se stav pacienta lepší?

1. Váha pacienta zůstává od příjmu stejná.
2. Systolický tlak pacienta se snížil.
3. Při poslechu plic je slyšet méně chrůpků.
4. Výdej moči je 1500 ml za den.

7. Klientka, která je přijímána v akutní psychóze, tvrdí, že slyší „strašné hlasy“ a myslí si, že její souseď „po ní jde“. Která z následujících reakcí sestry je nejlepší?

1. Co dělá váš souseď, že se toho bojíte?
2. Jak dlouho už ty „strašné hlasy“ slyšíte?
3. Vašeho souseda sem nepustíme, takže budete v bezpečí.
4. Co přesně vám ty „strašné hlasy“ říkají?

8. Sestra vyšetřuje psychomotorický vývoj 7měsíčního dítěte. Které z následujících chování považuje sestra za neobvyklé?

1. Dítě pije z hrnku a trochu tekutiny vylije.
2. Dítě nadzvedne hrudník a horní část břicha nad podložku s pomocí rukou.
3. Dítě napodobuje zvuky, které vydává sestra.
4. Dítě hlasitě pláče, když matka opouští místnost.

9. U klienta je diagnostikováno pravostranné srdeční selhání. Který z následujících příznaků bude sestra očekávat?

1. Intermitentní klaudikace.
2. Dušnost.
3. Dependentní otoky (níže položených částí těla).
4. Plicní chrůpky.

10. Sestra učí klientku v 10. týdnu těhotenství o vhodném cvičení. Které z následujících rčení klientky je dokladem toho, že edukace byla úspěšná?

1. V době těhotenství bych neměla provozovat kontaktní sporty.
2. I když jsem těhotná, mohu se příští týden začít učit lyžovat.
3. Až budeme příští měsíc na dovolené, mohu se potápět.
4. Horká koupel po cvičení mi udělá dobře.

PhDr. Marie Zvoníčková
Mgr. Jana Heřmanová

certifikované lektorky NCLEX-RN firmy
G5 Plus, s. r. o., (www.G5Plus.com),

Ústav pro lékařskou etiku a ošetrovatelství 3. LF UK,
Praha

(herman.ova@volny.cz)